

O seguinte protocolo de manejo da dor foi preparado para que seja global e levou-se em conta não somente as diferentes modalidades analgésicas como também o acesso aos fármacos no mundo inteiro. A aplicação deverá ser guiada pelas necessidades analgésicas específicas e as necessidades de cada indivíduo em particular. Este protocolo foi reproduzido a partir do “Tratado Global da dor da WSAVA”, inclui uma revisão resumida porém completa sobre o reconhecimento da dor, suas diferentes modalidades, e o tratamento para os distintos cenários da dor em cães e gatos. O Tratado Global da dor da WSAVA foi publicado no Journal of Small Animal Practice e está disponível na forma de livre acesso no site [www.wsava.org](http://www.wsava.org) na seção do Conselho global da dor.

## Níveis de dor associada a variadas condições.

<b>Dor severa à intolerável.</b>	
Infartos e tumores do sistema nervoso central	Pancreatite necrotizante ou colecistite
Meningite	Trombose/ isquemia
Reparação de fraturas com dano de tecidos moles extenso	Câncer ósseo
Cirurgia espinhal	Osteodistrofia hipertrófica
Ablação do canal auditivo	Trombose aórtica
Lesões por queimaduras	Dor neuropática (fisgadas/ inflamação nervosa, hérnia aguda de discos intervertebrais)
Fraturas articulares ou patológicas	Inflamação (ampla, <i>por exemplo</i> , peritonite, fasciculite, celulite <i>em especial por estreptococos</i> )
Amputação de membros	

<b>Dor moderada à severa</b>	
<b>(varia com o grau da doença ou lesão)</b>	
Artrite imunomediada	Lesão, inflamação ou acometimento de tecidos moles em etapas iniciais ou em resolução
Panosteíte	Doença do disco intervertebral
Dor capsular por organomegalia	Torções mesentéricas, intestinais, gástrica e outras
Distensão de órgão oco	Peritonite com abdômen séptico
Ruptura diafragmática por trauma	Mucosite
Pleurite	Câncer oral
Trauma (Ex., ortopédico, de cabeça, grande quantidade de tecidos moles)	Mastite
Feridas causadas por frio	Distócia
Obstrução uretral, ureteral e/ou biliar	Ressecção e reconstrução ampla decorrente de massa/tumor ou cirurgia ortopédica corretiva (osteotomias, cirurgia de reparação do ligamento cruzado; artrotomias abertas)
Glaucoma	
Ulceração ou abrasão corneana	
Uveíte	

<b>Dor moderada</b>	
Danos em tecidos moles ( <i>menos graves que os anteriores</i> )	Artroscopia diagnóstica e laparoscopia
Obstrução uretral	Cistite
Ovariohisterectomia	Osteoartrite

Dor leve à moderada	
Doença peridontal	Drenagem torácica
Otite	Punção de abscessos
Lacerações superficiais	Orquiectomia
Cistite leve	

Informação de Mathews, K (2000) *Vet Clin NA, Sm Anim Pract.* 30, 729-752.

Para informação adicional sobre as doses farmacêuticas, ver a tabela no site [www.wsava.org](http://www.wsava.org) (Tratado Global sobre da dor da WSAVA).

WSAVA reconhece os patrocinadores do Conselho Global da Dor.

